Cahors le 2e 9bre 1782

Sur l'hydrocele par le seton.

Lagarde

No. 22.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C 26 N 3227

Messieurs

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Votre erudition generalement avouée, et que j'admirerai toujours, en mon particulier, le Zele que j'ai pour mon etat, forment les deux motifs qui m'imposent un devoir necessaire d'oser vous adresser le petit memoire. je serois a l'avance penetré des sentimens d'une gratitude infinie, si je pouvois me flatter de meriter ~~de~~ votre bienfaisante ~~l'honneur d'une reponse~~.

il s'agit de prononcer sur un fait de pratique. un long détail deviendroit ennuyeux, et encore seroit il plus inutile, il vous suffit d'apercevoir les objets pour les saisir, je serai donc aussi succint qu'il me sera possible. j'entre en matiere

les principaux moyens qu'on ait employés jusqu'ici dans la vüe d'obtenir la cure radicale de ~~la tunique vaginale~~ l'hydrocele de la tunique vaginale du testicule, peuvent se reduire a l'incision et au caustique; ces deux methodes sont rejettées par la plus part des praticiens d'aujourd'hui, comme etant egalement dangereuses, cruelles et incertaines, et c'est ce qui a dû les déterminer a se borner a la

Coté trois feuillets LeSchollier H. Dussau

ARC 18 d 7 n° 22

Cure palliative par la voie d'une simple ponction
qu'on repete suivant les occurrences.
J'ai crû, ~~[illegible]~~, que puisque l'observation demontre
qu'on a pu parvenir a la cure radicale de l'hydrocele
de la tunique vaginale du cordon par l'employ du
seton, je pouvois sans beaucoup m'exposer, prendre
sur moy de tenter le meme succès, en traitant
l'hydrocele de la capsule du testicule par la methode
que je me propose de decrire; elle a en effet justifié
mon attente.
Les instrumens necessaires à cette operation sont.
1o un trocart en tout semblable a celuy dont on se
sert pour les ponctions ordinaires qu'on fait aux
bourses, mais avec cette seule difference que sa
canule doit avoir environ un quart de poule de
diametre.
2o une autre canule d'argent, et d'un diametre
tel qu'elle puisse s'adapter librement dans la
cavité de la 1ere. cette 2de canule doit avoir cinq
poules de longueur.
3o. une aiguille a seton ayant six poules et demi
de longueur, se terminant a son extremité superieure
par un poincon semblable à celuy d'un trocart et
a l'autre bout par une ouverture longuette propre
a recevoir une s. q. des fils forts, et grossiers,
d'une soye blanche, et crüe, et d'un volume a
pouvoir passer librement dans le conduit de
la deuxieme canule. l'extremité inferieure
admet deux rainures laterales destinées a loger
une partie des fils de soye afinque le seton

passe plus aisement dans la partie souffrante.

. . . . . . . . . . . . .

Les instrumens disposés, et le malade assis dans un fauteuil, je plonge le trolart énoncé, dans la partie anterieure et inferieure de la tumeur, je degage le poincon de sa canule, et lorsque l'evacuation est faite je continue de soutenir la canule avec le doigt indice, et le pouce de la main gauche pendant que de la main droite, j'introduis la 2de canule dans celle du trolart que je pousse jusqua la partie superieure de la tunique vaginale et jusqua ceque j'en sens l'extremite a la partie superieure du scrotum: ces deux canules ainsi dirigées, et assujeties, dans le scrotum par le pouce et le doigt indice de la main gauche, j'introduis de la main droite, l'aiguille armée du seton, dans la canule reçue dans celle du trolart, et a la faveur de ce conducteur, je la pousse jusquà ceque j'ai decidé la perforation de la tunique vaginale et du scrotum; je saisis alors de la main droite la pointe de l'aiguille pour la degager, et desqu'il est sorti par l'ouverture superieure une portion de seton d'une longueur suffisante, j'en degage l'aiguille au moyen d'un coup de ciseau donné a l'extremité superieure du seton, laquelle je lie lachement par un noeud coulant avec son extremité inferieure, et l'operation

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

est finie, sans le secours d'aucun aide —

immediatement aprés et sans autre appareil, je —
prescris au malade de se metre dans son lit, et le —
reduis a une diete ordinaire.

Vers le 2me jour le testicule et le scrotum commencent
a s'enflammer, a se tumefier, et a presenter des —
simptomes qui caracterisent la hernie humorale ou
un testicule gonflé par la repercussion de l'humeur
gonorrhoique; cet accident attendu, et necessaire pour
le succés de l'operation, est traité par les remedes —
propres a l'inflammation, au moyen de quoy elle
est bientot appaisée, la douleur, et la tumefaction
ne tardent point a devenir moins sensibles, a cette
epoque je fais succeder les discussifs aux emolliens. —

vers le 3e ou 4e jour je pense les deux petites —
ouvertures avec un plumaceau couvert d'un melange
de cerat, et de basilicum afin d'en ramollir les bords —
et de favoriser une suppuration qui a toujours —
été d'une tres petite quantité; dans les jours suivants
et a mesure que le gonflement, et l'inflammation —
diminuent, je tente d'extraire successivement, et de
jour en jour pendant tout le tems de la cure un ou
deux fils, observant cependant de ne point trop tirailler

; si par cas ils ~~adherentent~~ adherent, trop fortement, je renvoye alors l'effet de ma tentative au lendemain, ou plus loin ; leur extraction devient plus aisée, a mesure que les parties sont rapellées a leur etat naturel, lequel est determiné dans l'espace d'une quinsaine des jours.

c'est d'après la lecture de votre savant dictionaire communiqué a l'encyclopedie que j'ai sçu que le beaume de soulphre par sa vertu dessilative, et epulotique ne contribueroit pas peu a affermir la cure, et c'est cequi m'a determiné a en faire usage pendant quinse jours ou trois semaines après l'entiere guerison.

j'ai pratiqué, ~~monsieur~~, trois foix, cette operation et toujours avec un egal succès a un petit depot près tres superficiel qui parut aux bourses de l'un de mes trois malades, et qui fut bientot gueri : une pareille epreuve ne semble telle pas devoir suffire pour constater l'efficacité d'une operation dont la reussite est fondée d'ailleurs sur un principe raisoné qui nous fait presque voir a l'oeil la demarche de la nature ; ne parait il pas en effet qu'on ne peut se dispenser de convenir que la tunique vaginale ne souffre point la moindre deperdition de substance, et que la cure doit s'operer par l'adhesion de la tunique vaginale avec l'albuginée terminaison qu'on peut presumer etre la plus ordinaire d'une hernie essentiellement humorale, et qui etablit la difference materiale entre la methode qui

employé l'incision et le caustique et celle qui a fait l'objet de mes observations.

il me reste a desirer, messieurs pour rendre cette methode d'autant plus utile par l'employ frequant qui en sera fait dés le moment qu'elle sera revetüe de ~~votre~~ l'approbation de l'academie, il me reste a desirer, dis-je, que mon memoire soit ~~accueilli~~ acceuilli ~~dans~~ ~~maitre de l'art a qui il appartient si fort de reduise les objets a leur juste valeur~~: votre suffrage, messieurs, m'enhardiroit a la pratiquer et le succés constant que je serois des lors en droit d'en attendre fourniroit une preuve authentique, et publique du bon choix que j'ai sû faire de mes juges

j'ai l'honeur d'etre avec des sentimens de la consideration la plus respectueuse

Messieurs.

Votre tres humble
tres obeissant et tres devoüé serviteur
Lagarde chirurgien

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE